

ANEKS 1 metodološkom uputstvu za prevenciju i kontrolu infekcije sa SARSCoV 2 i oboljenja COVID-19 u predškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo

1. U slučaju da je roditelj pozitivan na SARSCoV2 – dijete se odmah po saznanju isključuje iz pohađanja vrtića iz svoje odgojne grupe te se isti dan treba testirati na SARSCoV2
2. U slučaju da dijete ima simptome COVID-19 a dolazilo je u vrtić (npr. roditelji su sakrili činjenicu da oni imaju simptome COVID-19 oboljenja i da su mogli zaraziti dijete), odmah se treba isključiti iz pohađanja vrtića i testirati isti dan.
3. Ukoliko u stavu 1. i 2. djeca budu SARSCoV2 pozitivna i u pitanju je samo jedno dijete iz odgojne grupe, ostala djeca nastavljaju pohađanje vrtića uz pojačane higijensko-epidemiološke mjere, te ukoliko se u narednih 6 dana pojavi u istoj grupi još jedno dijete ili više njih, sa simptomima COVID-19 oboljenja, obavezno odmah pozvati roditelje da izuzmu dijete iz vrtića, te isti dan ukoliko je moguće testiraju dijete na SARSCoV2. Ukoliko dijete bude negativno (u ovom slučaju ne smije biti pozitivan niko od članova njegove porodice), ostala djeca nastavljaju sa pohađanjem vrtića, a to dijete dok god ima simptome ostaje na kućnom liječenju (eventualno bolničkom ako je neophodno). Ukoliko se desi da ovo drugo dijete iz iste odgojne grupe bude SARSCoV2 pozitivno, onda se ostatak odgojne grupe šalje u samoizolaciju 14 dana (računa se dva dana prije početka simptoma kod drugog djeteta da je bilo zarazno, te na taj način i brojati narednih 14 dana izolacije).
4. U slučaju da je uposlenik vrtića COVID-19 oboljeli, te ukoliko nije primjenjivao, dva dana prije početka simptoma dok je dolazio u vrtić, preporučene H-E mjere protiv širenja SARSCoV2 virusa svi njegovi bliski kontakti koji nisu vakcinisani javljaju se svom nadležnom ljekaru i idu u samoizolaciju, a ukoliko su vakcinisani sa dvije doze i da je od druge doze prošlo 14 dana, ne trebaju ići u samoizolaciju već samo pojačati preporučene H-E mjere narednih 14 dana. U slučaju pojave bilo kojeg simptoma kod vakcinisanih bliskih kontakata u tom periodu, oni ostaju kod kuće u samoizolaciji od tog dana te se obavezno javljaju svom nadležnom ljekaru.

Izradila RJ za Epidemiologiju